

Juego de azar problemático y trading problemático: relación con la impulsividad y el consumo de sustancias en población general

Elena Donat Serrano^a, David Francisco Barraza Díaz^b, Carmen Ferrer Pérez^c,
^a Dpo. de Psicobiología. Facultad de Psicología y Logopedia, Universidad de Valencia (UV)
^b Máster DITPA, Departamento de Psicobiología, UV
^c Dpo. de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología y Logopedia, UV

INTRODUCCIÓN

El *gambling* y el *trading* comparten características como la exposición al riesgo, la incertidumbre y la posibilidad de obtener recompensas económicas. Aunque el *trading* es una actividad financiera legítima, en determinados casos puede adquirir un patrón problemático similar al observado en otras conductas adictivas.

OBJETIVO: explorar la relación entre *gambling* y *trading* problemático y su asociación con impulsividad y consumo de sustancias en población general.

MATERIAL Y MÉTODOS


Muestra (**N = 113**)
54,9% mujeres · 45,1% hombres
Edad: 37,5 ± 14,1 años (20–71)

Juego patológico → Problem Gambling Severity Index (**PGSI**) (López-González et al., 2018)

Nivel de riesgo PGSI	n	%
Sin riesgo	77	68,1
Riesgo bajo	18	15,9
Riesgo moderado	12	10,6
Riesgo alto / juego problemático	6	5,3

Trading problemático → Trading Disorder Scale (**TDS**) (Coloma-Carmona et al., 2025)

Participación en trading últimos 12 meses




Solo un participante alcanzó el punto de corte para posible trading problemático

Impulsividad → Impulsive Behaviour Scale (**UPPS-P**) (Cándido et al., 2012)

Prevalencia de consumo de las sustancias y riesgo asociado → **ASSIST v3.1** (OMS, 2011)

Sustancia	Consumo alguna vez en la vida n (%)
Tabaco	94 (83,2)
Bebidas alcohólicas	108 (95,6)
Cannabis	83 (73,5)
Cocaína	37 (32,7)
Estimulantes tipo anfetamina	41 (36,3)
Inhalantes	40 (35,4)
Sedantes o pastillas para dormir	57 (50,4)
Alucinógenos	28 (24,8)
Opiáceos	11 (9,7)
Esteroides y otros	8 (7,1)

RESULTADOS



CONCLUSIONES

Gambling y trading problemático muestran una relación positiva y comparten asociaciones con el consumo de sustancias, lo que justifica seguir explorando sus posibles mecanismos psicológicos comunes