

Predictores de la gravedad de la adicción al juego de azar en una muestra clínica en tratamiento

Carral-Hormigo, Coral¹; González-Roz, Alba¹; Iza-Fernández, Clara¹; Weidberg, Sara¹; García-Pérez, Ángel¹; Secades-Villa, Roberto¹; López-Fernández, Iván².

Universidad de Oviedo

Grupo de Investigación en Conductas Adictivas

LARPA

¹Grupo de Investigación en Conductas Adictivas (GCA), Universidad de Oviedo (Oviedo, España).

²LARPA: Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (Oviedo, España).

INTRODUCCIÓN



El juego problemático afecta al 1,4% de la población española entre 15 y 64 años¹.



Los estudios realizados en muestras clínicas de pacientes en tratamiento son escasos.

OBJETIVO



Examinar los correlatos de la gravedad de la adicción al juego incluyendo variables **sociodemográficas, psicológicas y relacionadas con el juego** en una muestra de pacientes en tratamiento.

MÉTODO

Muestra

- 45 usuarios
- Edad media = 42,6 (DT = 14,6)
- 88,9% hombres
- En tratamiento por trastorno de juego en la asociación LARPA (Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias)

Instrumentos

- **G-SAS:** Escala para la Evaluación de los Síntomas del Trastorno por Juego (Díaz-Sanahuja et al., 2023).
- **GACS:** Escala de Craving para el Juego (Young & Wohl, 2009).
- **GBQ:** Cuestionario de Creencias del Jugador (Ubillos-Landa et al., 2024).
- **PHQ-9:** Cuestionario de Salud del Paciente (González-Blanch et al., 2018).

Análisis

Coeficientes de correlación de Spearman y regresión lineal múltiple.

RESULTADOS

La gravedad de los síntomas de la adicción al juego se asoció positivamente con la puntuación del craving total ($\rho = 0,316$; $p = 0,036$), especialmente con la dimensión de deseo por jugar ($\rho = 0,426$; $p = 0,004$).

	Gravedad del juego (G-SAS)	Craving (GACS)	Creencias sobre el juego (GBQ)	PHQ-9
Gravedad del juego (G-SAS)	1,00	0,32*	0,21	0,29
Craving (GACS)	0,32*	1,00	0,52***	0,36*
Creencias relacionadas con el juego (GBQ)	0,21	0,52***	1,00	0,46**
PHQ-9	0,29	0,36*	0,46**	1,00

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

En la regresión lineal múltiple, el modelo final explicó el **55% de la varianza** de la gravedad de la adicción al juego (R^2 corregida = 0,55; $F(2, 41) = 27,8$; $p < 0,001$).

Las variables predictoras fueron el **deseo por jugar** ($\beta = 0,628$; $p < 0,001$) y el **sexo** ($\beta = 0,975$; $p = 0,005$), observándose puntuaciones más elevadas en las mujeres.

CONCLUSIONES

- El **craving** fue el principal predictor de la gravedad de los síntomas del trastorno por juego, especialmente la dimensión de **deseo por jugar**².
- Aunque la sintomatología depresiva y las distorsiones cognitivas se asociaron significativamente con la gravedad, no contribuyeron significativamente a su predicción en el modelo.
- Estos resultados refuerzan la importancia de desarrollar **intervenciones transdiagnósticas** que aborden tanto **factores emocionales como variables específicas implicadas en el mantenimiento del trastorno por juego**, incorporando una perspectiva de género.

REFERENCIAS

- ¹Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. (2025). *Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2025: Indicador admitidos a tratamiento por adicciones comportamentales. Juego de azar, uso de videojuegos, uso problemático de internet y otros trastornos adictivos en las encuestas de drogas en España EDADES, ESTUDES y en los indicadores del OEDA*. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad.
- ²Westerberg, T., Håkansson, A., & Berglund, K. (2026). The role of craving in gambling behavior: Examining its relevance and links to psychological distress, personality, and demographics. *BMC Psychology*, 14, 74. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03816-4>