

Aplicación de Análisis de Clases Latentes a la identificación de patrones en las agresiones sexuales en presencia de drogas (ASPD) en población universitaria

USC

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rial Boubeta, A. ¹; Quiñones Gómez, A. ¹; Gómez Salgado, P. ¹; Isorna Folgar, M. ² y García Couceiro, N. ¹

UNIVERSIDADE DE VIGO

¹Universidad de Santiago de Compostela; ²Universidad de Vigo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO	MÉTODO
Las Agresiones Sexuales en Presencia de Drogas (ASPD) constituyen un importante problema de salud pública entre la población juvenil. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones las analizan como un fenómeno relativamente homogéneo, lo cual limita el desarrollo de estrategias preventivas eficaces. Por ello, el objetivo de este estudio fue identificar perfiles de ASPD mediante un análisis de clases latentes y analizar su asociación tanto con variables personales, sociodemográficas, como contextuales.	Durante el curso 2024/25 se llevó a cabo un estudio observacional, analítico y transversal, basado en datos de autoinforme recogidos entre la población universitaria de Galicia. La muestra inicial estuvo compuesta por 3503 estudiantes de grado, de entre 18 y 30 años (M=20,03; DT=2,056). El análisis se realizó sobre <u>313 víctimas</u> con datos completos. Se estimaron modelos de clases latentes a partir de 7 conductas (comentarios sexuales invasivos, tocamientos o besos no consentidos, acorralamiento, insistencia frente a negativas, masturbación, sexo oral y penetración). La selección del modelo se realizó considerando los índices de ajuste AIC y BIC, la parsimonia y la interpretabilidad clínica.

RESULTADOS

1. SOLUCIÓN DEL MODELO Y DISTRIBUCIÓN DE CLASES

Comparación de modelos

Clases	AIC	BIC
2	2248,443	2304,636
3	2193,814	2279,976
4	2183,947	2300,079
5	2187,506	2333,608

Aunque el modelo de cuatro clases presentó el menor valor de AIC, el modelo de tres clases obtuvo el BIC más bajo y mostró un mejor equilibrio entre ajuste, parsimonia e interpretabilidad, por lo que fue seleccionado como solución final.

Distribución de las clases latentes

Clase Latente	Porcentaje	n
Coerción sin prácticas sexuales explícitas	55%	172
Agresión sexual multiconductual	24%	75
Contacto sexual con prácticas explícitas moderadas	21%	66

2. PERFIL DE CONDUCTAS EN CADA CLASE

Coerción Sin Prácticas Sexuales Explícitas

- Comentarios sexuales invasivos
- Insistencia frente a negativas
- Tocamientos/besos no consentidos
- Baja presencia de prácticas explícitas

Contacto Sexual con Prácticas Explícitas Moderadas

- Tocamientos/besos no consentidos
- Probabilidades intermedias de masturbación, sexo oral y penetración
- Menores probabilidades de comentarios sexuales invasivos, insistencia y acorralamiento

Agresión Sexual Multiconductual

- Múltiples conductas simultáneas
- Comentarios invasivos, insistencia y acorralamiento
- Alta presencia de prácticas explícitas

3. FACTORES ASOCIADOS A LAS CLASES LATENTES Sexo de la persona víctima $\chi^2 = 6,20$; $p = ,045$; $V = ,141$ Sexo de la persona agresora $\chi^2 = 9,56$; $p = ,048$; $V = ,124$ Tipo de DFSA $\chi^2 = 9,90$; $p = ,042$; $V = ,126$ Conocimiento previo a la agresión $\chi^2 = 11,41$; $p = ,003$; $V = ,191$ Uso problemático de internet $\chi^2 = 6,55$; $p = ,038$; $V = ,145$ Repetición del episodio $\chi^2 = 12,71$; $p = ,002$; $V = ,201$ Contexto de la agresión $\chi^2 = 26,63$; $p < ,001$; $V = ,208$	Sin asociaciones significativas - Orientación Sexual ($\chi^2 = 0,55$; $p = ,760$; $V = ,042$) - Consumo Problemático de Cannabis ($\chi^2 = 3,73$; $p = ,155$; $V = ,109$) - Consumo Problemático de Alcohol ($\chi^2 = 5,01$; $p = ,082$; $V = ,127$) - Búsqueda de Atención Sanitaria ($\chi^2 = 0,12$; $p = ,943$) - Denuncia de la Agresión ($\chi^2 = 3,30$; $p = ,192$)
--	--

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

Las ASPD no constituyen un fenómeno homogéneo, sino que presentan perfiles conductuales diferenciados, relacionados principalmente con factores contextuales y relacionales (contexto, conocimiento previo, tipo de DFSA, repetición del episodio...). La mayoría de las características individuales de las víctimas no mostraron asociaciones significativas, excepto el uso problemático de internet, más frecuente en el perfil de agresión sexual multiconductual. En conjunto, estos hallazgos contribuyen a desplazar el foco explicativo y preventivo desde las características o los patrones de consumo de las víctimas hacia las circunstancias en las que se produce la agresión. Desde esta perspectiva, la prevención debe reforzarse en contextos de ocio susceptibles a estas situaciones, promoviendo la identificación de señales de alerta y, de forma transversal, la visibilización de la violencia sexual estructural y la educación en igualdad de género.

REFERENCIAS
1.Isorna, M., Souto, C., Rial, A., Alias, A., & McCartan, K. (2017). Drug-facilitated sexual assault and chemical submission. Psychology, Society, & Education, 9(2), 263-282. https://doi.org/10.25115/psye.v9i2.701 2.Rial, A., García-Couceiro, N., Gómez, P., Braña, T., & Isorna, M. (2023). Menores y agresiones sexuales facilitadas por drogas: entre la Sumisión y la Vulnerabilidad Química. Adicciones (2024), 36 (3), 317-328. https://doi.org/10.20882/adicciones.1871